Click to prove you're human

La dentera, también conocida como sensibilidad dental o hipersensibilidad dental, es un fenómeno que se caracteriza por el dolor, la incomodidad y el desagrado que se concentra en los dientes ante ciertos estímulos. Se pueden identificar dos tipos: la que se desencadena por acciones fisiológicas y aquella que en la que la subjetividad de la persona es su detonante.Ciertamente, la dentera no aparece solo ante la interacción con bebidas y alimentos sólidos; sino también ante sonidos o experiencias de otro tipo. A menudo las personas se refieren a ella como poner los dientes de punta; una expresión popular en los países angloparlantes. Te enseñamos las causas de la dentera y qué se puede hacer para contrarrestar la reacción.Síntomas de la denteraLa dentera es una reacción universal. Aunque los síntomas y la intensidad pueden variar de una persona a otra, lo cierto es que todos estos comparten una característica en común: se desencadenan debido a un estímulo externo.Generalmente se produce al comer o beber alimentos muy fríos, calientes o duros, aunque también pueden aparecer al escuchar sonidos desagradables.Por ejemplo, el rechinar de una tiza sobre una superficie puede desencadenar reacciones de este tipo. Los sonidos particularmente agudos o que se perciben como desagradables (de manera subjetiva) ocasionan malestar focalizado en los dientes. Veamos algunos de los síntomas clásicos de esta reacción:Aumento de la sensibilidad en los dientes.Dolor cuando la pieza dental interactúa con un objeto externo o interno (roces con la legua, beber o comer alimentos).Irritabilidad y cambios bruscos en el humor.Desesperación para que la fuente que ocasiona la incomodidad desparezca.Angustia y ansiedad.Incapacidad para comer o beber.Impulso por huir del lugar.La dentera es un fenómeno real que, aunque es cierto que está mediado por circunstancias fisiológicas, existe una gran participación de variables psicológicas. Es por esta razón que los síntomas pueden ser o muy leves o mayúsculos; y extenderse desde solo unos segundos hasta varios minutos. La mayoría de las veces la incomodidad en los dientes se acompaña de una fuerte irritabilidad o enojo.Causas de la denteraSi bien es una condición transitoria y benigna, eso no quita que la dentera sea extremadamente molesta para algunas personas.Podemos determinar dos tipos de desencadenantes de la dentera: la sensibilidad dental y las experiencias subjetivas y psicológicas. Estas dos causas no son incompatibles entre sí, sino que la mayor parte del tiempo de manifiestan en conjunto. Analizamos a continuación qué se esconde detrás de cada una y por qué es un fenómeno más complejo de lo que parece.Sensibilidad dentalLa sensibilidad dental es la principal causa de la dentera. Los expertos la describen como un dolor de dientes transitorio asociado con una variedad de estímulos exógenos. Se estima que hasta el 43 % de las personas tienen algún grado de sensibilidad dental, una condición que es más frecuente entre los 25 y 35 años de edad. Recogemos algunas de sus causas:Cepillarse los dientes con demasiada fuerza.Uso de cepillos de dientes y pastas dentales de baja calidad.Rechinar los dientes por la noche (bruxismo).Comer o beber con regularidad bebidas o alimentos muy ácidos (café, alcohol, carnes, pan y demás).Comer o beber con regularidad bebidas o alimentos muy fríos o muy calientes.Masticar hielo.Blanqueamientos dentales repetitivos.Caries dentales.Infección sinusal.Estrés.Clima muy frío.Trastornos alimentarios (en especial aquellos que generan vómitos frecuentes).Reflujo gastroesofágico.Enfermedad de las encías, como la gingivitis.Dientes partidos.La sensibilidad en los dientes puede impedir a una persona comer y beber, y condiciona de muchas formas su bienestar. Con frecuencia la dentera se usa como sinónimo de la sensibilidad dental, otras veces como un síntoma de ella. En todo caso son reacciones que se superponen, ya que hay que tener en cuenta los mecanismos psicológicos para explicar todo el espectro de reacciones.Experiencias psicológicasLos antecedentes de exposición a ciertas situaciones incómodas pueden promover la aparición de dentera relacionada con aspectos psicológicos.Cada persona tiene un grado de tolerancias objetivo y subjetivo ante ciertos estímulos. Por ejemplo, la capacidad para resistir el aumento o el descenso de los alimentos (u otras interacciones) y la receptividad que se tiene para soportar determinadas frecuencias de sonido.Veamos algunos ejemplos de cómo la asimilación de algunos sonidos pueden desencadenar dentera en una persona:Rozar una pizarra con las uñas o con una tiza.Hacer fricción con un tenedor en un plato de porcelana.Ruido del freno repentino de un vehículo.La conexión de un micrófono a una fuente de sonido.El corte de una amoladora angular.El sonido de una cuerda de un violín que no está correctamente afinado.Estos son algunos ejemplos, aunque sirven de ilustración para comprender que la dentera no siempre se desencadena por alteraciones en las piezas dentales. La reacción está relacionada con la sensibilidad del oído a la frecuencia de sonidos. El humano promedio solo puede detectar las frecuencias de onda que oscilan entre 20 hasta los 20 000 Hertzios.Cuando el sonido supera estas frecuencias, el organismo desencadena una serie de reacciones para hacerte frente a él, entre ellas una necesidad urgente de huir o detener la fuente del sonido. Una reacción extrema a ciertos sonidos se conoce como misofonía.Tal y como señalan los expertos, la misofonía se relaciona con la hiperactividad sensorial y con algunos trastornos psiquiátricos. A propósito de esto último, los pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo son propensos a manifestar estas reacciones. Por supuesto, no todos los casos de dentera hacia los sonidos se explican por esta vía; solo son una reacción ante el ruido externo.Tratamiento de la denteraEl tratamiento de la dentera está condicionado por la intensidad, la frecuencia de los episodios y sus posibles causas. El especialista realizará una exploración general de la cavidad bucal para encontrar posibles catalizadores de la reacción.Dado que la mayoría de las veces el fenómeno es solo ocasional, y está mediado en gran parte por la subjetividad, a menudo se optará por mejorar los hábitos de higiene dental.Po ejemplo, mejorar los patrones y la frecuencia del cepillado, utilizar hilo dental, apostar por el enjuague bucal, evitar los alimentos muy ácidos, fríos o calientes, implementar una dieta equilibrada con una baja participación de alimentos ácidos, reducir el estrés en el día a día y evitar los blanqueamientos dentales frecuentes.Las enfermedades subyacentes se tratarán según proceda, esto en caso de que se encuentre una relación causal con la dentera. Reiteramos que se trata de una reacción universal, y no siempre está conectada con alteraciones en las piezas dentales. En todo caso, no dudes en consultar con un especialista si los episodios son repetitivos. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos experimentado la desagradable sensación de tericia dental. Este fenómeno, también conocido como dentera, se refiere a la respuesta involuntaria que sentimos en los dientes y encías ante ciertos estímulos, como morder algo frío o escuchar el chirrido de una pizarra. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo! ¿Qué es la dentera y cómo afecta a nuestra salud bucodental? La tericia dental es una reacción controlada por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que regula nuestras acciones involuntarias. Aunque se desconoce su origen biológico exacto, algunos expertos sugieren que esta respuesta es inconsciente y hereditaria, y está relacionada con nuestros ancestros animales. Aunque la tericia dental no suele tener un efecto prolongado en nuestra salud bucodental, puede provocar bruxismo, una afección que puede provocar problemas en el esmalte y sensibilidad dental. ¿Cómo se puede prevenir y qué tratamientos existen? Aunque no se puede prevenir completamente, es posible reducir su riesgo identificando los estímulos que la desencadenan y evitándolos. Si la dentera ha provocado problemas de esmalte o sensibilidad dental por bruxismo, es importante acudir a un experto de nuestra clínica dental en vitoria para que evalúe el mejor tratamiento. En Clínica Dental Susana Ocio, estamos a tu disposición para ayudarte a identificar y abordar este problema. Nuestro equipo de profesionales puede recomendarte el uso de una férula de descarga o la remineralización de los dientes para tratar cualquier problema dental que pueda estar relacionado con la tericia dental. Nos esforzamos por brindar una experiencia cómoda y personalizada para cada uno de nuestros pacientes, desde el primer examen dental hasta el seguimiento posterior al tratamiento. Estamos comprometidos a brindar atención dental excepcional a nuestros pacientes y a ayudarles a mantener una sonrisa saludable y radiante. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para más información. ¡Cuida de tu salud bucodental con Clínica Dental Susana Ocio! La sensibilidad dental, o dentera, es una condición común que afecta a una gran parte de la población, generando molestias significativas en la vida cotidiana, especialmente en verano al aumentar la ingesta de alimentos fríos. En este artículo, exploramos en profundidad qué es la sensibilidad dental, sus causas, cómo distinguirla de otras afecciones dentales. Además, te contamos los mejores métodos para eliminarla tanto en casa como mediante tratamientos profesionales. ¿Qué es la dentera, o sensibilidad dental? La sensibilidad dental, conocida popularmente como dentera, es una condición que afecta a tus dientes Se caracteriza por un dolor agudo y temporal en los dientes sensibles al consumir alimentos o bebidas frías, calientes, dulces o ácidas, así como al cepillarse los dientes. Esta sensación incómoda puede limitar la calidad de vida y hacer que evitemos ciertos alimentos o actividades. Causas de la sensibilidad dental La causa de la sensibilidad dental puede variar, aunque generalmente se debe a la exposición de la dentina, la capa interna del diente, que queda desprotegida cuando el esmalte dental se desgasta o las encías se retraen. Entre las principales causas de sensibilidad dental se incluyen: Cepillado agresivo: el uso de cepillos de dientes de cerdas duras o cepillarse con demasiada fuerza puede desgastar el esmalte dental. Bruxismo: el hábito de rechinar los dientes puede causar desgaste en el esmalte. Enfermedades periodontales: las enfermedades de las encías pueden causar la retracción de las mismas, exponiendo la dentina. Consumo de alimentos ácidos: los cítricos, refrescos y otros alimentos ácidos pueden erosionar el esmalte dental. Procedimientos dentales: algunos tratamientos dentales pueden provocar temporalmente sensibilidad dental. Cómo distinguir la sensibilidad dental de las caries Distinguir la sensibilidad dental de las caries es crucial para recibir el tratamiento adecuado. Mientras que la sensibilidad dental suele ser un dolor agudo y temporal desencadenado por estímulos específicos (como alimentos o bebidas frías o calientes), el dolor de caries es más constante y puede intensificarse con el tiempo. Las caries también suelen ir acompañadas de otros síntomas como mal aliento, manchas o agujeros visibles en los dientes. Si sientes dolor o molestias en tus dientes, te recomendamos acudir a nuestra clínica, donde nuestros expertos podrán determinar la causa de tus molestias y te propondrán la mejor solución para tratarlo. Elimina la sensibilidad dental Eliminar la sensibilidad dental es fundamental para mejorar tu calidad de vida y disfrutar plenamente de tus alimentos y bebidas favoritos. A continuación te mostramos diferentes opciones para acabar con ella. Cómo eliminar la sensibilidad dental en casa Eliminar la sensibilidad dental en casa es posible siguiendo algunos consejos y adoptando buenos hábitos de higiene oral. Aquí te dejamos algunos métodos eficaces: Cepíllate suavemente: usa un cepillo de cerdas suaves y técnica de cepillado adecuada para evitar el desgaste del esmalte. Enjuague con agua salada: enjuagarte con agua tibia mezclada con una cucharadita de sal puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor gracias a las propiedades antisépticas de la sal, que además te ayudará a reducir la inflamación de encías. Té de manzanilla: otra buena opción en caso de padecer de dientes sensibles es el enjuague bucal con té de manzanilla, eso sí, una vez se haya enfriado. Evita alimentos ácidos: reduce el consumo de alimentos y bebidas ácidas para proteger el esmalte dental. Mantén una buena higiene oral: cepíllate al menos dos veces al día y usa hilo dental para prevenir enfermedades de las encías. ¿Qué medicamento tomar para la sensibilidad dental? Utiliza una pasta dental desensibilizante: estas pastas ayudan a aliviar el dolor con el uso regular. Estos tipos de pasta de dientes utilizan ingredientes como el nitrato de potasio o el fluoruro de estaño, que ayuda a bloquear las señales de dolor a los nervios del diente. Enjuague con fluoruro: utiliza enjuagues bucales que contengan fluoruro para fortalecer el esmalte dental. Medicamentos antiinflamatorios: si padeces de sensibilidad dental y esta viene acompañada de inflamación o un dolor más generalizado, puedes utilizar medicamentos recomendados por tu dentista. Tratamiento recomendado para la sensibilidad dental El tratamiento recomendado para la sensibilidad dental puede variar dependiendo de la causa subyacente. En casos leves de dentera, los cambios en la higiene oral y el uso de productos desensibilizantes pueden ser suficientes. Sin embargo, si la sensibilidad dental es causada por problemas más graves como enfermedades periodontales o desgaste severo del esmalte, puede ser necesario un tratamiento profesional. Estos tratamientos pueden incluir: Aplicación de barniz de fluoruro: un tratamiento que fortalece el esmalte y reduce la sensibilidad. Recubrimiento dental: procedimientos como el sellado dental para proteger la dentina expuesta. Cirugía de encías: en casos de recesión gingival, puede ser necesaria una cirugía para cubrir las raíces expuestas. Tratamiento de conductos: en casos extremos, donde la sensibilidad se debe a problemas en la pulpa dental, puede ser necesario un tratamiento de conductos. ¿Te puedes hacer un blanqueamiento si tienes sensibilidad dental? Las personas que tienen sensibilidad o hipersensibilidad dental si que pueden realizarse un blanqueamiento dental. Estos casos los tratamos con especial atención, y si es necesario, se realiza un tratamiento desensibilizante previo para minimizar el riesgo de aumento de sensibilidad con el proceso del blanqueamiento dental. En Clínica Castelo contamos con una gran experiencia en este tipo de casos, y todos ellos con un gran resultado final. En conclusión, la sensibilidad dental, o dentera, es una condición muy común y tratable. Entender sus causas y cómo distinguirla de otras condiciones dentales es el primer paso para encontrar el alivio adecuado. Consulta a tu dentista de confianza y sigue sus recomendaciones para ayudar a eliminar la sensibilidad dental y mejorar tu calidad de vida. En Clínica Castelo, estamos especializados en tratamientos desensibilizantes y nos comprometemos a ofrecerte el cuidado dental más avanzado y personalizado para que puedas disfrutar de una sonrisa sin dolor. No dudes en visitarnos para obtener un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado para tus dientes sensibles. Tu bienestar dental es nuestra prioridad. La dentera es una sensación que puede resultar incómoda y desconcertante para muchas personas. A menudo, se define como un hormigueo o una molestia que se siente en los dientes y encías, desencadenada por ciertos estímulos. Este artículo explorará en profundidad la dentera y sus implicaciones. Además de su definición, abordaremos las causas, efectos y tratamientos existentes para esta curiosa sensación. También discutiremos la relación entre la dentera y otros fenómenos, así como la diferencia con la tiricia. ¿Qué es la dentera? La dentera, también conocida como tericia, es una sensación molesta que se caracteriza por un hormigueo o una reacción involuntaria en los dientes. Muchas personas experimentan esta sensación al escuchar ciertos sonidos irritantes o incluso al tocar ciertos objetos. Este fenómeno se asocia a menudo con el sistema nervioso autónomo, que regula las respuestas involuntarias del cuerpo. Esta sensación puede ser tan intensa que algunas personas sienten la necesidad de cubrirse los oídos o cerrar los ojos. Sin embargo, el origen biológico de la dentera aún no está completamente claro. Existen teorías que sugieren que puede estar relacionada con la sensibilidad dental o el bruxismo. Es importante mencionar que la dentera no es peligrosa, pero puede generar incomodidad y malestar en quienes la experimentan. Identificar los desencadenantes específicos es crucial para manejar mejor esta sensación. ¿Causas y efectos de la dentera? Existen diversas causas que pueden desencadenar la dentera en las personas. Algunos de los factores más comunes incluyen: Estímulos sonoros: Sonidos irritantes o altos pueden causar esta sensación. Temperaturas extremas: Cambios bruscos de temperatura en alimentos o bebidas pueden provocar la dentera. Contacto físico: La fricción o el contacto directo con ciertos objetos también pueden ser desencadenantes. Los efectos de la dentera pueden variar de una persona a otra. Algunos pueden experimentar solo un ligero hormigueo, mientras que otros pueden sentir tensión muscular o cerrar los ojos involuntariamente. En casos más extremos, puede llevar a reacciones involuntarias que resultan incómodas. La dentera puede, en algunos casos, estar relacionada con el bruxismo, donde la persona aprieta o rechina los dientes. Esto puede llevar a un desgaste del esmalte dental y otros problemas dentales si no se maneja adecuadamente. ¿Hay alguna razón concreta para sentir dentera? La razón exacta por la que algunas personas sienten dentera sigue sin estar completamente definida. Sin embargo, se ha observado que ciertas actividades o situaciones pueden aumentar la probabilidad de experimentar esta sensación. Por ejemplo, situaciones de estrés o ansiedad pueden amplificar la respuesta del sistema nervioso. Además, la diferencia individual juega un papel crucial. Algunas personas son más sensibles a determinados estímulos que otras. Esto significa que lo que puede ser solo una pequeña molestia para algunos, puede ser extremadamente incómodo para otros. Por otro lado, hay quienes se preguntan si la dentera es hereditaria. Aunque no hay pruebas concluyentes, se han reportado casos en los que familiares cercanos comparten esta experiencia, sugiriendo que podría haber un componente genético. ¿Cómo se puede prevenir y qué tratamientos existen? Actualmente, no existen métodos definitivos para prevenir la dentera. Sin embargo, hay algunas estrategias que pueden ayudar a mitigar su aparición. Aquí hay algunas recomendaciones: Identificar y evitar desencadenantes: Prestar atención a los sonidos o situaciones que suelen provocar la dentera puede ser de gran ayuda. Prácticas de relajación: Técnicas como la meditación o respiración profunda pueden ayudar a reducir la ansiedad y, por ende, la sensibilidad. Consulta con un dentista: Un profesional puede ofrecer orientación sobre el manejo de la sensibilidad dental y el bruxismo. En cuanto a tratamientos, aunque la dentera en sí misma no tiene un tratamiento específico, se pueden considerar opciones para abordar sus efectos. Si la dentera está asociada con el bruxismo, el dentista puede recomendar protectores bucales para prevenir el desgaste dental. No obstante, es importante recordar que no todas las personas que experimentan dentera necesitarán tratamiento. Muchas veces, la identificación de los desencadenantes y la simple adaptación a ellos es suficiente. ¿Es la dentera inofensiva? En términos generales, la dentera se considera una sensación inofensiva. No se asocia con enfermedades graves y no suele tener consecuencias serias. Sin embargo, puede ser un indicativo de problemas subyacentes, como la sensibilidad dental o el bruxismo. Aunque no representa un riesgo para la salud, las personas que experimentan esta sensación con frecuencia pueden encontrarla muy incómoda. En estos casos, se recomienda buscar consejo profesional para abordar cualquier problema dental que pueda estar relacionado. Además, es fundamental tener en cuenta que la percepción individual de la dentera puede variar. Lo que una persona considera inofensivo, para otra puede ser una experiencia muy desagradable. Dentera o tiricia: cuál es la diferencia? La dentera y la tiricia son términos que a menudo se confunden. Sin embargo, aunque ambos se refieren a sensaciones desagradables, tienen características distintivas. La tiricia, también conocida como tericia, se refiere a una sensación similar pero se asocia más con la sensibilidad en la piel y la exposición a estímulos externos. Mientras que la dentera se centra en una sensación de hormigueo en los dientes y encías, la tiricia puede manifestarse a través de una mayor sensibilidad en áreas como la piel, lo que puede incluir sensaciones de picor o ardor. Ambos fenómenos pueden ser desencadenados por factores similares, como estímulos sonoros o cambios de temperatura. Sin embargo, es importante que las personas reconozcan la diferencia entre ambos para buscar el tratamiento adecuado si es necesario. Preguntas relacionadas sobre la dentera ¿Qué es la dentera? La dentera es una sensación incómoda que se presenta en los dientes y encías, provocada por ciertos estímulos, como sonidos irritantes o temperaturas extremas. Es considerada una respuesta involuntaria del sistema nervioso autónomo, que reacciona a estos estímulos. ¿Qué significa que te dé dentera? Sentir dentera significa experimentar un hormigueo o malestar en los dientes, el cual puede ser desencadenado por diferentes factores. Esto puede ser un indicativo de sensibilidad dental o simplemente una reacción a un estímulo irritante. ¿Por qué nos da tiricia? La tiricia ocurre como respuesta a estímulos externos, que pueden provocar sensaciones desagradables. Esto puede incluir la exposición a sonidos irritantes o contacto con elementos que causan incomodidad, como materiales ásperos. ¿Qué es una dentera de dientes? La dentera de dientes se refiere específicamente a la sensación de hormigueo o incomodidad que se siente en los dientes. Esta puede ser provocada por factores como la sensibilidad dental, estímulos sonoros o el contacto físico, y puede variar en intensidad de una persona a otra. La dentera, también denominada, tiricia, se manifiesta como una reacción desagradable e involuntaria del cerebro a un estímulo sonoro, táctil o visual, pero también ante un recuerdo desagradable. Se tata de una forma de rechazo o sensación de grima que se percibe como negativa y que se tiende a evitar. La dentera constituye un conjunto de síntomas difuso que se manifiesta de diferente forma en los individuos, generalmente en los dientes y encías en forma de contracción y hormigueo desagradable. El individuo experimenta pequeños calambres en la boca que irradian desde las encías hacia lo dientes, pero también hacia el exterior de la cara, acompañados de escalofríos, piel de gallina y vello de punta. También puede provocar tensión muscular y aumento del ritmo cardíaco.No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de la dentera. Su origen podría encontrarse en el sistema nervioso autónomo, la parte del organismo que controla acciones involuntarias como la respiración, la digestión o el latido cardíaco. De este modo, se trata de una reacción involuntaria e inevitable; lo único que podemos hacer es tratar de evitar los estímulos que la causan.Algunos estudios han demostrado que determinadas señales acústicas que causan dentera poseen características físicas similares a las del llanto de un bebé, por lo que esta sensación desagradable podría estar asociada mecanismos de supervivencia muy básicos. Se sabe, por ejemplo, que el sonido que surge al tocar una pizarra con las uñas es similar al empleado por ciertos macacos para advertir de un peligro a la manada. Sonidos de este tipo podrían haber sido empleados por primates durante la noche como forma de advertencia ante amenazas.No existe una única sensación que cause dentera. Además, puede variar de unas personas a otras, mientras que para unas un determinado estímulo provoca esta reacción no voluntaria, para otras ese mismo estímulo no causa ninguna sensación negativa.Sin embargo, pueden identificarse un conjunto de estímulos que la mayor parte de las persona asocian a esta sensación desagradable: Sonidos desagradables: el chirriar de una tiza en la pizarra o de otros objetivos, gritos agudos, sonido provocado por el arrastre de muebles… Morder o chupar objetos o alimentos: hielo, trozos de tela, piel de melocotón, el palo de un helado, morder un limón… Tacto: arañar una pared de cal, tocar un globo, tocar una pizarra con las uñas, secarse el ombligo tras la ducha, arrastrar los cubiertos sobre un plato cerámico…No existen personas más sensibles a experimentar dentera o tiricia, pero sí hay personas más sensibles a los estímulos sensoriales, sonoros o táctiles. La Sociedad Española de Nerología señala en un estudio que la situación del individuo que experimenta la dentera determina su intensidad. Así, afecta más a quien está relajado que a quien experimenta altos grados de estrés, lo que encaja con la explicación biológica ligada a mecanismos de defensa. Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. La dentera, también conocida como sensibilidad dental o hipersensibilidad dental, es un fenómeno que se caracteriza por el dolor, la incomodidad y el desagrado que se concentra en los dientes ante ciertos estímulos. Se pueden identificar dos tipos: la que se desencadena por acciones fisiológicas y aquella que en la que la subjetividad de la persona es su detonante.Ciertamente, la dentera no aparece solo ante la interacción con bebidas y alimentos sólidos; sino también ante sonidos o experiencias de otro tipo. A menudo las personas se refieren a ella como poner los dientes de punta; una expresión popular en los países angloparlantes. Te enseñamos las causas de la dentera y qué se puede hacer para contrarrestar la reacción.Síntomas de la denteraLa dentera es una reacción universal. Aunque los síntomas y la intensidad pueden variar de una persona a otra, lo cierto es que todos estos comparten una característica en común: se desencadenan debido a un estímulo externo.Generalmente se produce al comer o beber alimentos muy fríos, calientes o duros, aunque también pueden aparecer al escuchar sonidos desagradables.Por ejemplo, el rechinar de una tiza sobre una superficie puede desencadenar reacciones de este tipo. Los sonidos particularmente agudos o que se perciben como desagradables (de manera subjetiva) ocasionan malestar focalizado en los dientes. Veamos algunos de los síntomas clásicos de esta reacción:Aumento de la sensibilidad en los dientes.Dolor cuando la pieza dental interactúa con un objeto externo o interno (roces con la legua, beber o comer alimentos).Irritabilidad y cambios bruscos en el humor.Desesperación para que la fuente que ocasiona la incomodidad desparezca.Angustia y ansiedad.Incapacidad para comer o beber.Impulso por huir del lugar.La dentera es un fenómeno real que, aunque es cierto que está mediado por circunstancias fisiológicas, existe una gran participación de variables psicológicas. Es por esta razón que los síntomas pueden ser o muy leves o mayúsculos; y extenderse desde solo unos segundos hasta varios minutos. La mayoría de las veces la incomodidad en los dientes se acompaña de una fuerte irritabilidad o enojo.Causas de la denteraSi bien es una condición transitoria y benigna, eso no quita que la dentera sea extremadamente molesta para algunas personas.Podemos determinar dos tipos de desencadenantes de la dentera: la sensibilidad dental y las experiencias subjetivas y psicológicas. Estas dos causas no son incompatibles entre sí, sino que la mayor parte del tiempo de manifiestan en conjunto. Analizamos a continuación qué se esconde detrás de cada una y por qué es un fenómeno más complejo de lo que parece.Sensibilidad dentalLa sensibilidad dental es la principal causa de la dentera. Los expertos la describen como un dolor de dientes transitorio asociado con una variedad de estímulos exógenos. Se estima que hasta el 43 % de las personas tienen algún grado de sensibilidad dental, una condición que es más frecuente entre los 25 y 35 años de edad. Recogemos algunas de sus causas:Cepillarse los dientes con demasiada fuerza.Uso de cepillos de dientes y pastas dentales de baja calidad.Rechinar los dientes por la noche (bruxismo).Comer o beber con regularidad bebidas o alimentos muy ácidos (café, alcohol, carnes, pan y demás).Comer o beber con regularidad bebidas o alimentos muy fríos o muy calientes.Masticar hielo.Blanqueamientos dentales repetitivos.Caries dentales.Infección sinusal.Estrés.Clima muy frío.Trastornos alimentarios (en especial aquellos que generan vómitos frecuentes).Reflujo gastroesofágico.Enfermedad de las encías, como la gingivitis.Dientes partidos.La sensibilidad en los dientes puede impedir a una persona comer y beber, y condiciona de muchas formas su bienestar. Con frecuencia la dentera se usa como sinónimo de la sensibilidad dental, otras veces como un síntoma de ella. En todo caso son reacciones que se superponen, ya que hay que tener en cuenta los mecanismos psicológicos para explicar todo el espectro de reacciones.Experiencias psicológicasLos antecedentes de exposición a ciertas situaciones incómodas pueden promover la aparición de dentera relacionada con aspectos psicológicos.Cada persona tiene un grado de tolerancias objetivo y subjetivo ante ciertos estímulos. Por ejemplo, la capacidad para resistir el aumento o el descenso de los alimentos (u otras interacciones) y la receptividad que se tiene para soportar determinadas frecuencias de sonido.Veamos algunos ejemplos de cómo la asimilación de algunos sonidos pueden desencadenar dentera en una persona:Rozar una pizarra con las uñas o con una tiza.Hacer fricción con un tenedor en un plato de porcelana.Ruido del freno repentino de un vehículo.La conexión de un micrófono a una fuente de sonido.El corte de una amoladora angular.El sonido de una cuerda de un violín que no está correctamente afinado.Estos son algunos ejemplos, aunque sirven de ilustración para comprender que la dentera no siempre se desencadena por alteraciones en las piezas dentales. La reacción está relacionada con la sensibilidad del oído a la frecuencia de sonidos. El humano promedio solo puede detectar las frecuencias de onda que oscilan entre 20 hasta los 20 000 Hertzios.Cuando el sonido supera estas frecuencias, el organismo desencadena una serie de reacciones para hacerte frente a él, entre ellas una necesidad urgente de huir o detener la fuente del sonido. Una reacción extrema a ciertos sonidos se conoce como misofonía.Tal y como señalan los expertos, la misofonía se relaciona con la hiperactividad sensorial y con algunos trastornos psiquiátricos. A propósito de esto último, los pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo son propensos a manifestar estas reacciones. Por supuesto, no todos los casos de dentera hacia los sonidos se explican por esta vía; solo son una reacción ante el ruido externo.Tratamiento de la denteraEl tratamiento de la dentera está condicionado por la intensidad, la frecuencia de los episodios y sus posibles causas. El especialista realizará una exploración general de la cavidad bucal para encontrar posibles catalizadores de la reacción.Dado que la mayoría de las veces el fenómeno es solo ocasional, y está mediado en gran parte por la subjetividad, a menudo se optará por mejorar los hábitos de higiene dental.Po ejemplo, mejorar los patrones y la frecuencia del cepillado, utilizar hilo dental, apostar por el enjuague bucal, evitar los alimentos muy ácidos, fríos o calientes, implementar una dieta equilibrada con una baja participación de alimentos ácidos, reducir el estrés en el día a día y evitar los blanqueamientos dentales frecuentes.Las enfermedades subyacentes se tratarán según proceda, esto en caso de que se encuentre una relación causal con la dentera. Reiteramos que se trata de una reacción universal, y no siempre está conectada con alteraciones en las piezas dentales. En todo caso, no dudes en consultar con un especialista si los episodios son repetitivos. La dentera, también conocida como sensibilidad dental o hipersensibilidad dental, es un fenómeno que se caracteriza por el dolor, la incomodidad y el desagrado que se concentra en los dientes ante ciertos estímulos. Se pueden identificar dos tipos: la que se desencadena por acciones fisiológicas y aquella que en la que la subjetividad de la persona es su detonante.Ciertamente, la dentera no aparece solo ante la interacción con bebidas y alimentos sólidos; sino también ante sonidos o experiencias de otro tipo. A menudo las personas se refieren a ella como poner los dientes de punta; una expresión popular en los países angloparlantes. Te enseñamos las causas de la dentera y qué se puede hacer para contrarrestar la reacción.Síntomas de la denteraLa dentera es una reacción universal. Aunque los síntomas y la intensidad pueden variar de una persona a otra, lo cierto es que todos estos comparten una característica en común: se desencadenan debido a un estímulo externo.Generalmente se produce al comer o beber alimentos muy fríos, calientes o duros, aunque también pueden aparecer al escuchar sonidos desagradables.Por ejemplo, el rechinar de una tiza sobre una superficie puede desencadenar reacciones de este tipo. Los sonidos particularmente agudos o que se perciben como desagradables (de manera subjetiva) ocasionan malestar focalizado en los dientes. Veamos algunos de los síntomas clásicos de esta reacción:Aumento de la sensibilidad en los dientes.Dolor cuando la pieza dental interactúa con un objeto externo o interno (roces con la legua, beber o comer alimentos).Irritabilidad y cambios bruscos en el humor.Desesperación para que la fuente que ocasiona la incomodidad desparezca.Angustia y ansiedad.Incapacidad para comer o beber.Impulso por huir del lugar.La dentera es un fenómeno real que, aunque es cierto que está mediado por circunstancias fisiológicas, existe una gran participación de variables psicológicas. Es por esta razón que los síntomas pueden ser o muy leves o mayúsculos; y extenderse desde solo unos segundos hasta varios minutos. La mayoría de las veces la incomodidad en los dientes se acompaña de una fuerte irritabilidad o enojo.Causas de la denteraSi bien es una condición transitoria y benigna, eso no quita que la dentera sea extremadamente molesta para algunas personas.Podemos determinar dos tipos de desencadenantes de la dentera: la sensibilidad dental y las experiencias subjetivas y psicológicas. Estas dos causas no son incompatibles entre sí, sino que la mayor parte del tiempo de manifiestan en conjunto. Analizamos a continuación qué se esconde detrás de cada una y por qué es un fenómeno más complejo de lo que parece.Sensibilidad dentalLa sensibilidad dental es la principal causa de la dentera. Los expertos la describen como un dolor de dientes transitorio asociado con una variedad de estímulos exógenos. Se estima que hasta el 43 % de las personas tienen algún grado de sensibilidad dental, una condición que es más frecuente entre los 25 y 35 años de edad. Recogemos algunas de sus causas:Cepillarse los dientes con demasiada fuerza.Uso de cepillos de dientes y pastas dentales de baja calidad.Rechinar los dientes por la noche (bruxismo).Comer o beber con regularidad bebidas o alimentos muy ácidos (café, alcohol, carnes, pan y demás).Comer o beber con regularidad bebidas o alimentos muy fríos o muy calientes.Masticar hielo.Blanqueamientos dentales repetitivos.Caries dentales.Infección sinusal.Estrés.Clima muy frío.Trastornos alimentarios (en especial aquellos que generan vómitos frecuentes).Reflujo gastroesofágico.Enfermedad de las encías, como la gingivitis.Dientes partidos.La sensibilidad en los dientes puede impedir a una persona comer y beber, y condiciona de muchas formas su bienestar. Con frecuencia la dentera se usa como sinónimo de la sensibilidad dental, otras veces como un síntoma de ella. En todo caso son reacciones que se superponen, ya que hay que tener en cuenta los mecanismos psicológicos para explicar todo el espectro de reacciones.Experiencias psicológicasLos antecedentes de exposición a ciertas situaciones incómodas pueden promover la aparición de dentera relacionada con aspectos psicológicos.Cada persona tiene un grado de tolerancias objetivo y subjetivo ante ciertos estímulos. Por ejemplo, la capacidad para resistir el aumento o el descenso de los alimentos (u otras interacciones) y la receptividad que se tiene para soportar determinadas frecuencias de sonido.Veamos algunos ejemplos de cómo la asimilación de algunos sonidos pueden desencadenar dentera en una persona:Rozar una pizarra con las uñas o con una tiza.Hacer fricción con un tenedor en un plato de porcelana.Ruido del freno repentino de un vehículo.La conexión de un micrófono a una fuente de sonido.El corte de una amoladora angular.El sonido de una cuerda de un violín que no está correctamente afinado.Estos son algunos ejemplos, aunque sirven de ilustración para comprender que la dentera no siempre se desencadena por alteraciones en las piezas dentales. La reacción está relacionada con la sensibilidad del oído a la frecuencia de sonidos. El humano promedio solo puede detectar las frecuencias de onda que oscilan entre 20 hasta los 20 000 Hertzios.Cuando el sonido supera estas frecuencias, el organismo desencadena una serie de reacciones para hacerte frente a él, entre ellas una necesidad urgente de huir o detener la fuente del sonido. Una reacción extrema a ciertos sonidos se conoce como misofonía.Tal y como señalan los expertos, la misofonía se relaciona con la hiperactividad sensorial y con algunos trastornos psiquiátricos. A propósito de esto último, los pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo son propensos a manifestar estas reacciones. Por supuesto, no todos los casos de dentera hacia los sonidos se explican por esta vía; solo son una reacción ante el ruido externo.Tratamiento de la denteraEl tratamiento de la dentera está condicionado por la intensidad, la frecuencia de los episodios y sus posibles causas. El especialista realizará una exploración general de la cavidad bucal para encontrar posibles catalizadores de la reacción.Dado que la mayoría de las veces el fenómeno es solo ocasional, y está mediado en gran parte por la subjetividad, a menudo se optará por mejorar los hábitos de higiene dental.Po ejemplo, mejorar los patrones y la frecuencia del cepillado, utilizar hilo dental, apostar por el enjuague bucal, evitar los alimentos muy ácidos, fríos o calientes, implementar una dieta equilibrada con una baja participación de alimentos ácidos, reducir el estrés en el día a día y evitar los blanqueamientos dentales frecuentes.Las enfermedades subyacentes se tratarán según proceda, esto en caso de que se encuentre una relación causal con la dentera. Reiteramos que se trata de una reacción universal, y no siempre está conectada con alteraciones en las piezas dentales. En todo caso, no dudes en consultar con un especialista si los episodios son repetitivos. La frase "te da dentera" se utiliza comúnmente para expresar una sensación de malestar o incomodidad frente a ciertas situaciones o estímulos. Dentera es un término coloquial que deriva del verbo "denter" y se refiere a esa sensación desagradable que se produce en los dientes o encías. Cuando alguien experimenta dentera, puede sentir una especie de vibración en los dientes, una ligera molestia o incluso un dolor más intenso. Esta sensación a menudo está relacionada con estímulos específicos, como escuchar el sonido de un objeto metálico rozando o el chirrido de las uñas en una pizarra. La dentera es un fenómeno personal y subjetivo, por lo que lo que causa malestar en una persona puede no afectar a otra de la misma manera. Algunas personas pueden experimentar dentera con mayor frecuencia o sensibil