

I'm not a bot























Alguns remédios para dor de dente, como o paracetamol, o ibuprofeno ou a codeína, agem aliviando a dor de dente leve a intensa. Encontre um Clínico Geral perto de você! Parceria com Buscar Médico No entanto, esses tipos de remédios não tratam a causa da dor de dente, especialmente se existir cárie, fratura no dente ou infecção. Assim, os remédios só devem ser utilizados com orientação do dentista, que também pode indicar o uso de antibióticos para combater infecções bacterianas ou até realizar um curativo com eugenol e óxido de zinco. Nos casos em que a dor é muito intensa ou não melhora após 2 dias, mesmo com o uso dos remédios, é aconselhável consultar um dentista para avaliar o dente afetado e iniciar o tratamento mais adequado. 11. Medicamentos para dor de dente O que são Os principais remédios que podem ser utilizados para tratar a dor de dente são: 1. Paracetamol O paracetamol é um analgésico e age inibindo a produção de substâncias responsáveis pela dor, como as prostaglandinas ou ciclo-oxigenases, e pode ser encontrado na forma de comprimidos ou de solução em gotas. Como usar: o paracetamol é indicado para dor de dente leve a moderada, até forte. Como usar: as doses de paracetamol para dor de dente em adultos e crianças com mais de 12 anos de 1 a 2 comprimidos de 500 mg, a cada 4 horas, conforme orientação do dentista. Para crianças com mais de 6 anos, 1 a 2 comprimidos de 250 mg, a cada 4 horas, conforme orientação do dentista. 2. Ibuprofeno O ibuprofeno é um anti-inflamatório, podendo ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos ou crianças com mais de 15 anos de 1 a 2 comprimidos de 500 mg, a cada 4 horas, conforme orientação do dentista. 3. Ibuprofeno O ibuprofeno é um anti-inflamatório, podendo ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos ou crianças com mais de 15 anos de 1 a 2 comprimidos de 500 mg, a cada 4 horas, conforme orientação do dentista. 4. Codeína A codeína é um opioide com efeito analgésico potente, sendo encontrada associada ao paracetamol, como o nome Tylex, sendo normalmente indicado para o alívio da dor de dente que não melhora com outros remédios analgésicos. Quando usar: a codeína + paracetamol (Tylex) é indicado nos casos de dor de dente de intensidade leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos ou crianças com mais de 15 anos de 1 a 2 comprimidos de 500 mg, a cada 4 horas, conforme orientação do dentista. 5. Ácido acetilsalicílico O ácido acetilsalicílico, mais conhecido como Aspirina, é um anti-inflamatório não esteróide que pode ser usado para dor de dente após a redução da produção de substâncias que causam a inflamação e também atua como analgésico, reduzindo a dor de dente. Quando usar: o paracetamol é indicado para dor de dente leve a moderada, até forte. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 1 a 2 comprimidos de 500 mg por dia. Saiba como tomar o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico não deve ser usado por grávidas, crianças com menos de 12 anos ou por pessoas com problemas no estômago ou no intestino, como gastrite, colite, ulcera ou sangramentos. Além disso, pessoas que usam regularmente o ácido acetilsalicílico como anticoagulante ou a varfarina não devem tomar a aspirina para o tratamento da dor de dente. Esse anti-inflamatório é vendido em farmácias e drogarias e pode ser comprado sem receita, no entanto, é aconselhado consultar o dentista para garantir o uso seguro. 6. Diclofenaco sódico O diclofenaco sódico é um agente anti-inflamatório, analgésico e antipirético que pode ser utilizado para diminuir a dor de dente, pois atua inibindo a produção de substâncias responsáveis pela dor. Como usar: a dose recomendada para adultos ou crianças com mais de 15 anos de 1 a 2 comprimidos de 500 mg, a cada 4 horas, conforme orientação do dentista. 7. Benzocaína A benzocaína é um anestésico local que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a benzocaína. 8. Lidocaína A lidocaína é um anestésico local que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a lidocaína. 9. Clorhexidina A clorhexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorhexidina. 10. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 11. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 12. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 13. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 14. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 15. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 16. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 17. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 18. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 19. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 20. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 21. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 22. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 23. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 24. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 25. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 26. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 27. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 28. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 29. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 30. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 31. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 32. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 33. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 34. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 35. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 36. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 37. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 38. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 39. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 40. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 41. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 42. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 43. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 44. Clorexidina A clorexidina é um antisséptico bucal que pode ser usado para dor de dente leve a moderada. Como usar: a dose recomendada para adultos é de 0,5 g de 0,5 g do gel, aplicado diretamente no dente que causa dor de dente. Saiba como usar a clorexidina. 45. Clo